# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-7-65 396480

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)
(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

*Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.*
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement Annuel
15F,00

– Bulletin N° 58 de Juillet 1965 –

## – AVERTISSEMENTS –

### VIGNE

VERS DE LA GRAPPE : Depuis quelque temps on assiste à un vol important de papillons d'Eudémis, surtout, mais aussi de Cochylis dans certains secteurs de la Circonscription, en particulier dans le Frontonnais (Hte-Garonne)et dans la région de Rabastens-Gaillac dans le Tarn. Ailleurs le vol est généralement faible mais il est possible que dans des secteurs où la Station ne dispose pas de postes de piégeage il puisse être également important.

En conséquence, dans tous les cas où des dégâts ont été constatés lors de la première génération, il y a lieu d'appliquer un traitement de type préventif, par poudrage de préférence, à partir du 12 Juillet.(les premières éclosions de chenilles devant se produire incessement).

Si l'on préfère intervenir avec un produit de type curatif, attendre une semaine environ pour traiter.

MILDIOU : Actuellement la vigne est un peu moins réceptive mais des sorties successives de taches, parfois importantes, vont se produire au cours des prochains jours, partout où des pluies sont tombées depuis le début du mois. Dans tous ces secteurs il y aurait intérêt à effectuer un nouveau traitement soigné, dès réception , notamment lorsque des taches existaient déjà à la fin du mois de Juin.

BLACK-ROT : Un traitement ne se justifie actuellement que dans les vignes habituellement très atteintes et dans les régions où les récents orages ont pu délaver le précédent traitement : Tarn-&-Garonne, Nord-Ouest du Gers, Lot, Tarn et localement en Hte-Garonne.

## – INFORMATIONS –

### CULTURES LEGUMIERES

MALADIES DU FEUILLAGE DU MELON : Les plantes se trouvent toujours à un stade de grande sensibilité alors que le temps demeure encore très incertain. En particulier dans les régions où les pluies de ces derniers jours ont pu délaver le traitement conseillé précédemment, il y aurait intérêt à le renouveler dès les prochaines menaces de pluie.

Employer une association de Manèbe et de soufre ou, si des taches d'Anthracnose on déjà été observées dans la culture, de Dichlone et de soufre.

TOULOUSE, le 9 JUILLET 1965

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles
J. BESSON – E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Midi –
Le Directeur – Gérant : L. BOUYX

767